

Checklista för läkare

Behandling med Deferasirox Orifarm Filmdragerad tablett

- Dosering
- Dosjustering
- Provtagningar och kontroller

Detta dokument belyser viktig information om dosering, dosjustering samt provtagningar och kontroller vid användning av Deferasirox Orifarm filmdragerad tablett. För fullständig information se Deferasirox Orifarm produktresumé på www.fass.se




12/2021


Orifarm Generics A/S

info@orifarm.com

orifarm.com



Provtagning og kontroller	Före behandlingsstart	Första månaden efter behandlingsstart • Efter dosändring	Varje månad	Var tredje månad	Varje år
S-Ferritin	X		X		
LIC (endast för patienter med NTDT)	X			X På barn med S-Ferritin ≤800 µg/l	
S-Kreatinin	X 2	Varje vecka	X		
Kreatininclearance och/eller plasma cystatin C	X	Varje vecka	X		
Proteinuri	X		X		
Leverfunktion (serumtransaminaser, bilirubin, alkaliskt fosfat)	X	Varannan vecka	X		
Vikt och längd	X				X På barn och ungdomar
Hörsel- och syntest (med funduskopi)	X				X
Könsmognad (barn)	X				X
Genomgång av all samtidig medicinering för att undvika interaktioner	Regelbundet samt vid ändringar i behandling ock/eller dosering				



Var uppmärksam på att förändringar i behandlingen även ska övervägas vid följande situationer

Avbryt behandlingen

- Vid S-Kreatinin >33 % över genomsnittet före behandlingen och/eller Kreatininclearance under nedre normalgränsen (<90 ml/min) trots sänkt dos
- Vid inhållande och progressiv ökning av leverenzymmer (serumtransaminaser)

Överväg att avbryta behandlingen

- Vid utveckling av oförklarlig cytopeni

Sänk dosen eller överväg att avbryta behandling

- Vid ihållande proteinuri
- Vid onormala nivåer av njurtubulimarkörer och/eller på klinisk indikation
- Vid syn- och/eller hörselstörningar

Annat §

* Se www.fass.se for ytterligare exempel pa beräkning eller justering av dos.

§ Se www.fass.se for information om dosjustering/behandlingsavbrott vid onormal njur- och leverfunktion, metabolisk acidos, allvarliga hudreaktioner eller overkanslighetsreaktioner.