

Materiale til apotekspersonalet

Tjekliste til apotekspersonalet - Vejledning til udlevering af retinoider

Produkterne nævnt i tabel 1 tilhører lægemiddelklassen retinoider, der medfører svære medfødte misdannelser. Føtal eksponering for retinoider, selv i kortere perioder, udgør en høj risiko for medfødte misdannelser og spontan abort.

Disse retinoider er derfor strengt kontraindiceret under graviditet og til kvinder i den fertile alder, medmindre alle betingelser i det svangerskabsforebyggende program for retinoider er opfyldt.

En negativ graviditetstest, udstedelse af recepten og udlevering af retinoider bør ideelt ske samme dag, alternativt må der maksimalt være 7 dage mellem udstedelse af recepten og udlevering af retinoider.

Hvis du har kendskab til, at en kvinde, som behandles med retinoider, er blevet gravid, skal behandlingen straks stoppes, og kvinden skal med det samme henvises til den ordinerende læge.

Hvis du har kendskab til, at en kvindelig patient er blevet gravid inden for 1 måned efter afslutning af behandling med isotretinoin og alitretinon eller inden for 3 år efter afslutning af behandling med acitretin, skal hun henvises til den ordinerende læge.

Som apotekspersonale må du kun udlevere retinoider efter at have tjekket følgende information:

For kvinder i den fertile alder:	
For at understøtte regelmæssig kontrol, herunder graviditetstests og monitorering, skal en recept på retinoider ideelt begrænses til en 30-dages beholdning.	
Alle patienter skal instrueres i:	
aldrig at give retinoider til en anden person	
at returnere eventuelt ubrugte kapsler til apotekspersonalet efter endt behandling	
ikke at donere blod under behandling med retinoider og efter afslutning af behandlingen på grund af den potentielle risiko for fostret hos en gravid transfusionsmodtager i nedenstående periode: - Isotretinoin og alitretinoin: 1 måned - Acitretin: 3 år	