

Deferasirox Orifarm Informationshæfte

Dit Deferasirox Orifarm informationshæfte

Dette informationshæfte indeholder vigtig information om blandt andet, hvordan du tager Deferasirox Orifarm korrekt, og hvordan der bliver fulgt op på din behandling.

Indholdsfortegnelse

Hvordan skal jeg tage Deferasirox Orifarm filmovertrukne tabletter?	3
Hvordan er opfølgningen af din behandling?	4
Din behandling med Deferasirox Orifarm	5
Har Deferasirox Orifarm nogle bivirkninger?.....	6
Kan jeg tage anden medicin?.....	7
Din baggrundsinformation	8
Start behandling med Dererasirox Orifarm	9

Hvordan skal jeg tage Deferasirox Orifarm filmovertrukne tabletter?

Hvad anvendes Deferasirox Orifarm til:

Deferasirox Orifarm bruges til at behandle kronisk jernophobning forårsaget af gentagne blodtransfusioner til patienter med beta-thallasæmi fra 6 år og opefter.

Deferasirox Orifarm anvendes til at behandle kronisk jernophobning, når behandling med deferoxamin ikke kan anvendes eller er uegnet til patienter med beta-thallasæmi med jernophobning forårsaget af få blodtransfusioner, hos patienter med andre former for anæmi og til børn i alderen 2-5 år.

Deferasirox Orifarm anvendes, når behandling med deferoxamin frarådes eller er utilstrækkelig til at behandle patienter fra 10 år og opefter med øget jernophobning relateret til deres thalassemi-syndrom, men uafhængig af blodtransfusioner.

Hvilken dosis skal jeg tage?

Den dosis af Deferasirox Orifarm, som din læge har ordineret, er baseret på din vægt, dit jernniveau, lever- og nyrefunktion og hvor ofte du får blodtransfusioner.

Hvilke tabletter skal jeg tage?

Deferasirox Orifarm filmovertrukne tabletter findes i forskellige styrker, og du skal muligvis tage mere end én. Din læge vil fortælle dig, hvor mange tabletter og hvilken styrke du skal tage hver dag.

Hvordan skal Deferasirox Orifarm filmovertrukne tabletter tages?

Deferasirox Orifarm filmovertrukne tabletter skal synkes hele med lidt vand. Hvis du ikke kan sluge hele tabletter, kan du knuse Deferasirox Orifarm filmovertrukne tabletter og drysse hele dosen på blød mad, såsom yoghurt eller æblemos. Hele dosis skal tages med det samme og ikke opbevares til senere brug. Deferasirox Orifarm filmovertrukne tabletter bør tages én gang dagligt. Du bør tage Deferasirox Orifarm på samme tidspunkt hver dag. Deferasirox Orifarm filmovertrukne tabletter kan tages på tom mave eller sammen med et let måltid.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer at tage Deferasirox Orifarm?

Hvis du glemmer at tage Deferasirox Orifarm-dosis, så tag den så hurtigt som muligt, også selvom det er senere på dagen. Tag den næste dosis som planlagt. Tag ikke en dobbeltdosis den følgende dag for at erstatte glemt(e) tablet(er).

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har taget mere Deferasirox Orifarm, end jeg burde?

Hvis du har taget flere Deferasirox Orifarm tabletter, end du burde, skal du straks kontakte din læge eller hospital, da hurtig, medicinsk behandling kan være nødvendig.

Du kan blandt andet få voldsomme mavesmerter, diarré, kvalme og opkastning samt nyre- eller leverproblemer.

Hvordan er opfølgningen af din behandling?

Under behandling med Deferasirox Orifarm vil der regelmæssigt blive taget blod- og urinprøver. Prøverne vil vise, hvordan du reagerer på behandlingen. Din læge kan justere dosis op eller ned afhængigt af resultatet af prøverne.

Undersøgelse	Før opstart med Deferasirox Orifarm	Hver måned	En gang pr. år
Jern <i>Serumferritin</i>	✓	✓	
Nyrer <i>Serumkreatinin</i>	✓ Denne test udføres to gange før start på Deferasirox Orifarm	✓ Ugentlig den første måned af behandlingen og den første måned efter en dosisjustering. Derefter en gang om måneden.	
Kreatinin-clearance	✓	✓ Ugentligt den første måned af behandlingen og den første måned efter dosisjustering	
Lever (<i>Serum transaminaser, bilirubin, alkalisk fosfatase</i>)	✓	✓ Anden uge i den første behandlingsmåned	
Urin (<i>Proteinuri</i>)	✓	✓	
Syn og hørelse	✓		✓
Vægt og højde	✓		✓
Børn: <i>Vurdering af kropsudvikling (f.eks. vægt, højde og kønsudvikling)</i>	✓		✓

Din læge skal muligvis også:

- Udføre en undersøgelse med magnetisk resonans billeddannelse, MR, for at kontrollere jernniveauet i hjertet og leveren.
- Tage en biopsi af dine nyrer, hvis der er mistanke om nyreskade.

Din behandling med Deferasirox Orifarm

Dit behandlingsmål

Målet med behandlingen med Deferasirox Orifarm er at få et jernniveau i kroppen, som er gavnligt for helbredet. Hver måned vil du se din læge til kontrol og opfølgning for at nå dit behandlingsmål.

Din læge sætter behandlingsmål baseret på en blodprøve kaldet serumferritin eller SF. Denne prøve viser, hvor meget jern du har i kroppen. Din læge vil enten sænke eller bevare dit SF-niveau.

Din Deferasirox Orifarm dosis

Din læge kan ændre din dosis baseret på dine SF-værdier, andre laboratorieprøver eller hvor ofte du får blodtransfusioner.

Efter at have taget Deferasirox Orifarm i 3-6 måneder skal du kontakte din læge for at høre, om behandlingen forløber som planlagt. Hvis ikke, så spørg din læge, hvilken plan han eller hun har for, at du kan nå dit behandlingsmål.

Mellem hvert lægebesøg

Vigtige hændelser kan forekomme mellem hvert lægebesøg. Skriv dem ned og informer din læge. Det kan f.eks. være:

- Bivirkninger
- Anden medicin
- Afvigelse fra ordineret dosis

Yderligere information om brugen af Deferasirox Orifarm og bivirkninger kan findes i indlægssedlen, som kan findes på www.indlægssedler.dk

Har Deferasirox Orifarm nogle bivirkninger?

Som al anden medicin kan Deferasirox Orifarm give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De fleste bivirkninger er milde til svære og forsvinder generelt, når kroppen vænner sig til behandlingen. Dette kan taget et par dage til uger.

De mest almindelige bivirkninger er kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, oppustethed, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, udslæt, hovedpine og kløe.

Nyre- og leverfunktion undersøges før behandling med Deferasirox Orifarm påbegyndes, og du overvåges regelmæssigt under behandlingen (se tabellen på foregående side).

Visse bivirkninger kan være alvorlige. Stop med at tage dette lægemiddel og fortæl det til lægen med det samme:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter), sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) eller bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt.

- Hvis du får alvorligt udslæt, besvær med at trække vejret og svimmelhed eller hævelse af hovedsageligt ansigtet og halsen (tegn på alvorlig allergisk reaktion).
- Hvis du oplever en kombination af nogle af følgende symptomer: udslæt, rød hud, blistre på læberne, øjne eller i munden, hudafskalninger, høj feber, influenzalignende symptomer, forstørrede lymfekirtler (tegn på alvorlige hudreaktioner).
- Hvis du oplever en kraftig nedsættelse af din urinproduktion (tegn på nyreproblemer).
- Hvis du oplever en kombination af døsighed, smerter i den øvre højre del af maven, gulfarvning af din hud eller øjne og mørk urin (tegn på leverproblemer).
- Hvis du oplever problemer med at tænke klart, huske information eller løse opgaver, er mindre opmærksom eller bevidst eller er meget træt og har lavt energiniveau (tegn på et højt niveau af ammoniak i dit blod, hvilket kan være forbundet med nyre- eller leversygdomme og kan medføre ændring i hjernefunktionen).
- Hvis du kaster blod op og/eller har sort afføring.
- Hvis du ofte oplever mavesmerter, specielt efter spisning eller indtag af Deferasirox Orifarm.
- Hvis du ofte oplever halsbrand.
- Hvis du oplever delvist tab af dit syn.
- Hvis du oplever voldsomme mavesmerter (pancreatitis).

Husk: fortæl altid din læge om eventuelle bivirkninger. Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage medicinen og straks kontakte din læge.

Se indlægssedlen for mere information om bivirkninger og alvorlige bivirkninger.

Kan jeg tage anden medicin?

Fortæl din læge eller apoteket, hvis du tager anden medicin, har taget anden medicin for nylig eller måske vil tage anden medicin. Det gælder også håndkøbsmedicin. Din læge skal muligvis overvåge virkningen af disse lægemidler med laboratorieundersøgelser.

Vær særligt opmærksom på at fortælle lægen om følgende vigtige lægemidler:

- Andre jernkelatorer, som ikke må tages sammen med Deferasirox Orifarm.
- Syreneutraliserende medicin (medicin til behandling af halsbrand), der indeholder aluminium, som du ikke må tage på samme tidspunkt af døgnet som Deferasirox Orifarm.
- Ciclosporin (bruges til at forhindre kroppen i at afstøde et transplanteret organ, eller til andre lidelser som gigt og udslæt).
- Simvastatin (bruges til at sænke kolesterol).
- Visse smertestillende eller antiinflammatoriske lægemidler (fx acetylsalicylsyre, ibuprofen, kortikosteroider).
- Orale bisphosphonater (bruges til behandling af osteoporose).
- Antikoagulerende medicin (bruges til at modvirke eller behandling af blodpropper).
- Hormonelle graviditetsforebyggende midler.
- Bepriidil, ergotamin (bruges til behandling af hjerteproblemer og migræne).
- Repaglinid (bruges til at behandle sukkersyge).
- Rifampicin (bruges til at behandle tuberkulose).
- Phenytoin, phenobarbital, carbamazepin (bruges til at behandle epilepsi).
- Ritonavir (bruges i behandlingen af HIV-infektion).
- Paclitaxel (bruges i kræftbehandling).
- Theophyllin (bruges i behandlingen af lungesygdomme såsom astma).
- Clozapin (bruges til behandling af psykiske sygdomme såsom skizofreni).
- Tizanidin (virker muskelafslappende).
- Cholestyramin (bruges til at sænke kolesterolniveauet i blodet).
- Busulfan (bruges som behandling for at ødelægge den originale knoglemarv inden en transplantation).

Svangerskabsforebyggelse

Hvis du tager p-piller eller p-plaster for at undgå graviditet, bør du derudover eller i stedet bruge en anden form for prævention (f.eks. kondom), idet Deferasirox Orifarm kan nedsætte effekten af p-piller og p-plaster.

Din baggrundsinformation

Information om din baggrund er vigtig for både dig og din læge for at planlægge din behandling med Dererasirox Orifarm. Spørg din læge, hvis du har brug for hjælp til at besvare disse spørgsmål.

General information

Fornavn	
Efternavn	
Fødselsdato	
Diagnose	

Har du fået blodtransfusioner? Hvis ja, hvor mange og hvor ofte?

Dit svar: _____

Har du andre problemer med helbredet?

Dit svar: _____

Tager du i øjeblikket medicin mod andre helbredsproblemer?

Dit svar: _____

Har du nogen allergier?

Dit svar: _____

Start behandling med Dererasirox Orifarm

Når din læge har bestemt din SF-værdi, og hvilken dosis Dererasirox Orifarm du skal have, kan du følge med i, hvordan behandlingen forløber. Udfyld dit behandlingsmål og andre oplysninger sammen med din læge.

Dato: _____

Min nuværende SF-værdi:	
Mit behandlingsmål er at reducere min SF til:	
Jeg vejer (kg):	
Hvor mange tabletter skal jeg tage om dagen af Dererasirox Orifarm?	
Hvornår på dagen skal jeg tage lægemidlet?	

Sæt kryds:

<input type="checkbox"/>	Jeg kan sluge tabletterne hele.
<input type="checkbox"/>	Jeg vil knuse tabletterne og drysse dem på blød mad som f.eks. yoghurt eller æblemos og spise det med det samme.

Notater: Lav noter eller skriv spørgsmål ned, som du ønsker at gennemgå med din læge



03/2022

Orifarm Generics A/S
info@orifarm.com
orifarm.com