

ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) – Läkarguide för förskrivning

Introduktion

ADHD är en vanlig neuropsykiatrisk störning hos barn och ungdomar. En multimodal behandlingstaktik rekommenderas för ADHD där metylfenidat (MPH) ofta förskrivs. Som för all medicinsk behandling måste en noggrann bedömning av nytta:risk utföras innan behandling inleds.

Det är viktigt att produkter med MPH används på ett konsekvent sätt och endast för lämpliga patienter på grund av MPH:s stimulerande egenskaper och den vanliga förekomsten av komorbiditeter i samband med ADHD. Mot denna bakgrund har kommittén för humanläkemedel (CHMP) granskat förskrivningsinformationen för "MPH-produkter" och utfärdat rekommendationer.

Det medföljande materialet utvecklades av tillverkarna av MPH-produkter för att bidra till en ökad medvetenhet om och antagandet av rekommendationer för användning av MPH.

Användning av detta material rekommenderas tillsammans med fullständig förskrivningsinformation för Methylphenidate Orifarm.

Utöver produktets förskrivningsinformation finns följande verktyg tillgängliga:

- En checklista som ska granskas/fyllas i innan behandling med MPH inleds:
Checklista 1 – Metylfenidat (MPH) Checklista före förskrivning
- En checklista som ska granskas/fyllas i under pågående behandling med MPH:
Checklista 2 – Metylfenidat (MPH) Checklista för fortgående övervakning av pågående behandling
- En tabell för fortgående övervakning under behandling med MPH

Syftet med checklistorna är att förse dig med en lättillgänglig förteckning över vad man ska titta efter hos patienten innan MPH förskrivs och under pågående behandling.

För ytterligare information, se fullständig förskrivningsinformation och bipacksedeln för Methylphenidate Orifarm.

Metylfenidat (MPH) som en del i det totala behandlingsprogrammet

Vid behandling av ADHD är metodisk utarbetad utbildning betydelsefull och ett psykosocialt stöd är i allmänhet nödvändigt. Där enbart stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga måste beslutet att använda MPH grundas på en mycket noggrann bedömning av svårighetsgraden hos barnets symtom.

Läkemedelsbehandling med MPH är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD.

Beakta följande för att säkerställa att användningen av MPH alltid är baserad på ovanstående:

- Diagnosen är grundad på en noggrann bedömning av svårighetsgrad och kronicitet av barnets symtom i förhållande till barnets ålder
- Diagnosen ställs enligt kriterierna i *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)* eller riktlinjerna i *International Classification of Diseases (ICD)*, samt grundas på fullständig anamnes och utvärdering av patienten
- Se till att såväl medicinska som specialiserade psykologiska, pedagogiska och sociala resurser används

Se fullständig förskrivningsinformation för Methylphenidate Orifarm för ytterligare information.